

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬  
第②類医薬品

# コフハイドリン液

コフハイドリン液は、せき、たんの症状緩和にすぐれた効果をあらわします。

## 特 長

- ・「ノスカピン塩酸塩水和物」「ジヒドロコデインリン酸塩」がせき中枢に働き、せきを鎮めます。
- ・せきどめ効果のある「ナンテンジツ」「キキョウ」「セネガ」といった3種類の生薬を配合しています。
- ・苦味と甘味を特長とするシロップ剤で、1才以上から大人まで、幅広くご服用いただけます。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
4. 過量服用・長期連用しないで下さい

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(裏面もお読み下さい。)

## 効能・効果

せき、たん。

## 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により、1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として、4時間の間隔において服用して下さい。

年 齢	1 回 量	備 考
15才以上(成人)	10mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。
11才以上15才未満	6mL	
8才以上11才未満	5mL	
5才以上8才未満	3mL	
3才以上5才未満	2.5mL	
1才以上3才未満	2mL	
1才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

## 成分・分量

成 分	1 日 量 (60mL) 中	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき、くしゃみの緩和
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	せき、くしゃみの緩和
ノスカピン塩酸塩水和物	60mg	せき、たんの緩和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻水の緩和
無水カフェイン	150mg	眠気防止
ナテンジツ流エキス(ナテンジツとして1,200mg)	1.2mL	せきの緩和
キキョウ流エキス(キキョウとして1,000mg)	1.0mL	せき、たんの緩和
セネガ流エキス(セネガとして1,000mg)	1.0mL	たんの緩和

添加物としてクエン酸、プロピレングリコール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、カラメル、ポビドン含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)びんの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5)使用期限はケース底面及びラベルに記載されています。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社  
TEL 0120-967-862  
FAX 0748-62-3417  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

# 日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62