

ニツシン浣腸30

紙箱

プラ袋

第2類医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

キャップ式容器

30g×2個

日本薬局方 グリセリン 15g

ニツシン浣腸30

製造販売元



日新製薬株式会社

滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62
電話 0120-967-862

第2類医薬品

成分・分量

本品30g中 日局グリセリン………15g
添加物としてベンザルコニウム塩化物液を含有する。


用法・用量

12才以上、1回1個を直腸内に注入して下さい。
それでも効果がみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 12才未満の小児には使用させないで下さい。
- (4) 浣腸にのみ使用して下さい。

効能・効果 便秘



4 987166 000661

使用上の注意

△ **してはいけないこと** ×

連用しないで下さい。(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)

■ **相談すること** ㊦

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
- (5) 次の診断を受けた人。
心臓病

2.2~3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

□ **その他の注意**

次の症状があらわれることがあります。
立ちくらみ、肛門部の刺激感、腹部不快感

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〔便秘しがちな方のために〕

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけて下さい。また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいらして下さい。2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけて下さい。
(例: 野菜類、果実、コンニャク、カンテン、海藻など)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけて下さい。4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

製造番号

使用期限